DIVERS COLÉOPTÈRES EXOTIQUES NOUVEAUX OU PEU CONNUS

PAR

Maurice PIC

Idgia dimidiata Gerst.

Cette espèce, de Zanzibar, se retrouve au Natal; elle diffère de *nigricollis* Pic, de Sierra-Leone, qui est très voisine, non seulement par le prothorax de coloration claire, mais encore par la forme du corps moins étroite.

Physcius longipennis n. sp.

Elongatus, nitidus, griseo pubescens, nigro-piceus, antennis ad basin pedibusque pro parte testaceis. Capite latissimo; thorace fere quadrato, distincte impresso; elytris latis, elongatis, pro parte substriatis, diverse punctatis. Long. 3,5 mill.

Amérique méridionale : ? Bolivie (coll. Pic).

Voisin de *brasiliensis* Pic, mais plus allongé, foncé sur l'avant-corps, etc.

Diverses espèces voisines de *Physcius* Champ., de l'Amérique méridionale, pourront se séparer, et se reconnaître entre elles, à l'aide du synopsis suivant :

1. Des traces de stries sur les élytres, ces organes étant entièrement foncés; tête bien plus large que le prothorax : 2.

1'. Pas de traces de stries sur les élytres qui sont au moins en majeure partie roussâtres; tête pas, ou à peine, plus large que le prothorax. Brésil : *subdepressus* Pic.

2. Avant-corps roux et plus robuste; tête peu rétrécie derrière les yeux; élytres plus larges et moins longs; pattes entièrement testacées. Brésil : *brasiliensis* Pic.

2'. Avant-corps noir et moins robuste; tête très rétrécie derrière les yeux; élytres moins larges et plus longs; pattes en partie foncées. ? Bolivie : *longipennis* Pic.

Hylophilus callanganus n. sp.

Satis elongatus, nitidus, sparse griseo pubescens, niger, elytris subcæruleis, antennis pedibusque nigris.

Assez allongé, mais non étroit, brillant, éparsément pubescent de gris, noir avec les élytres bleuâtres, membres foncés. Tête de la largeur du prothorax, tronquée postérieurement, à ponctuation forte et écartée ; yeux gris, gros, éloignés entre eux et ne touchant pas le bord postérieur de la tête ; antennes assez fortes, noires, à 2e article plus court que les 3e et 4e qui sont égaux ; prothorax court, inégal, sinué latéralement, impressionné transversalement sur son milieu et impressionné en outre à la base, à ponctuation forte et écartée ; élytres bien plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, un peu rétrécis à l'extrémité, à faible dépression antérieure, à ponctuation très forte et rapprochée. Long. 3 mill. environ. Pérou : Callanga (coll. Pic).

Voisin de *subcæruleus* Pic, de Bolivie, par sa coloration ; mais la structure et la ponctuation du prothorax sont différentes, les antennes sont moins grêles, etc.

Hylophilus (Olotelus) brevissimus n. sp.

Brevis et latus, subnitidus, griseo pubescens, rufo-testaceus, pedibus testaceis, femoribus posticis pro parte nigris.

Court et large, peu brillant, pubescent de gris, roux testacé, membres testacés à l'exception de la moitié basale des cuisses postérieures qui est noire. Tête de la largeur du prothorax, tronquée postérieurement, à ponctuation forte et dense, yeux grisâtres, moyens, éloignés entre eux et ne touchant pas le bord postérieur de la tête ; antennes testacées, un peu robustes, assez longues, à 2e article à peu près de la longueur des suivants ; prothorax fortement et densément ponctué, court, à angles antérieurs saillants, un peu rétréci en arrière, avec une faible dépression transversale près de la base ; élytres courts et larges, à épaules marquées mais arrondies, sans dépression antérieure nette, à ponctuation forte et rapprochée ; pattes testacées avec la moitié des cuisses postérieures foncée, ces dernières un peu épaissies. Long. près de 2 mill. Afrique orientale allemande : Usambara (coll. Pic).

Ressemble beaucoup à *pruinosus* Ksw., mais le prothorax possède une faible dépression près de sa base et la forme du corps est plus trapue.